



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS

A Zala Vármegyei Kormányhivatal, mint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró szerv (továbbiakban élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) a felsorolt települések szőlő ültetvényeiben a 2013 - 2024. évek növény-egészségügyi felderítései során szőlő arany színű sárgaság fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) zárlati károsító okozta fertőzést állapított meg, mely következtében a felsorolt településekre vonatkozóan

N Ö V É N Y - E G É S Z S É G Ü G Y I Z Á R L A T - o t
r e n d e l t e l .

A zárlati károsítóval fertőzött, illetve a fertőzés tüneteit mutató szőlő ültetvények 1 km-es körzetében lévő települések érintett bel- és külterületi (zártkerti) - ingatlanain található szőlő ültetvényeket és szőlő növényeket fertőzött körzetté nyilvánította.

A fertőzött területek 3 km-es körzetében lévő települések érintett bel- és külterületi (zártkerti) - ingatlanain található szőlő ültetvényeket és szőlő növényeket védő (puffer) körzetté jelölte ki.

A fertőzött körzetet és védő (puffer) körzetet körülhatárolt területté nyilvánította.

A szőlő arany színű sárgaság fitoplazma ellen jelenleg növényvédő szer nem áll rendelkezésre, ezért a hatékony védekezési mód:

- a fertőzött szőlő tőkék kivágása és

- a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés

A zárlati fertőzés terjedésének elkerülése és a betegség felszámolásának érdekében a körülhatárolt terület minden szőlő növény és ültetvény tulajdonosa, valamint használója az alábbi előírásokat köteles betartani:

Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus), mint a zárlati károsítót terjesztő rovarvektor elleni védekezés a zárlat fenntartásáig a rovar biológiájához időzítve, a vegetációs időszakban (június közepétől kezdődően) minimum 3 alkalommal kötelező.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által a körülhatárolt területeken elvégzett felmérések szerint az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) imágójának egyedszáma a szüret utáni időszakban is indokolja a védekezést. Az idei évben a szüret utáni időszakban történő felhasználásra szükséghelyzeti engedélyt kaptak a Karate Zeon 5 CS és Klartan 24 EW rovarölő szerek. A szüret utáni időszakban a Karate Zeon 5 CS és Klartan 24 EW rovarölő szerek maximum 2 alkalommal használhatók fel úgy, hogy a készítmények ugyanazon a területen egy évben csak kétszer juttathatók ki az engedélyokiratokban foglalt további egyéb előírások szigorú betartása mellett (<https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny>). Az eltérő hatóanyag tartalmú rovarölő szereket a szerrotáció kialakítása miatt felváltva szükséges használni.

Továbbá javasolt a szőlő levél hullásának kezdetét követő (októberi) időszakban az őszi lemosó permetezés elvégzése olaj tartalmú készítménnyel az amerikai szőlőkabóca által lerakott tojások gyérítése céljából. Az őszi lemosó permetezést nagy lé mennyiséggel szükséges elvégezni és a szőlő két éves és annál idősebb tőke részeire kell kijuttatni.

A kezelésekről nyilvántartást (permetezési naplót) szükséges vezetni, melyet az utolsó bejegyzéstől számított 3 évig meg kell őrizni!

AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY

NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.

Telefon: (36 92) 550-160, E-mail: noveny.talajvedelem@zala.gov.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

A növényvédő szerek kijuttatása során - adott esetben - figyelmet kell fordítani a gyártó ajánlása szerint a permetlé pH-jának beállítására, valamint a növényvédő szerek UV érzékenysége miatt a kijuttatás napszakának a megválasztására.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívja a szőlőtermelők figyelmét, hogy a védekezés során az integrált növényvédelem alapelveinek érvényre jutása érdekében a növényvédelmi technológia meghatározása során figyelemmel kell lenni a rezisztencia kialakulásának megelőzésére, ezért a növényvédő szerek okirataiban meghatározott kezelések évenkénti maximális számának betartása mindenkor szükséges.

Jelen felhívás az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szakmai javaslatának is tekintendő, így az agrár-környezetvédelmi programban szereplő támogatást igénylők egyszeri alkalmazásra az engedélyben foglaltaknak megfelelően felhasználhatják a környezetkímélő besorolásba nem került növényvédőszer-hatóanyagokat.

Az agrár-környezetvédelmi programban szereplő kedvezményezettek a pályázati felhívás részletszabályait tartalmazó 2b. mellékletének 2.1 pontja szerint jelen védekezési felhívás szerint a Nemzeti Irányító Hatóság által közleményben közzétett nem, vagy csak korlátozással használható növényvédő szert is felhasználhatnak a körülhatárolt területen belül. Az ilyen felhasználás **vis maior eseménynek minősül**, amely elismertetése a Nemzeti Kifizető Ügynökségnél szükséges. A vis maior elismerése iránti kérelmet és annak bekövetkezését igazoló dokumentumokat az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint a vis maior kérelem benyújtására szolgáló felületen keresztül kell benyújtania

Az agrár-ökológiai programban (AÖP) pedig a méhekre veszélyes szerek használati tilalma ültetvényekben gyakorlatot választóknak az engedélyokirat alapján méhekre kifejezetten vagy mérsékelten veszélyes, illetve kockázatos besorolású növényvédő szerek használata tilos.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv vizsgálata szerint a szőlő aranyszínű sárgaság betegség tünetei az idei évben korábban jelentek meg és az eddigi években nem tapasztalt mértékben jelentkeznek.

A betegség elleni védekezés másik pillére ebben az időszakban is a szőlő növények folyamatos szemlézése.

A fertőzési gyanú bejelentése kötelező az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére (Tel: 06/92/550-160, E-mail: noveny.talajvedelem@zala.gov.hu) a 2025. évi fertőzések alapján fertőzött körzetbe sorolt, a védő (puffer) zónába tartozó települések, a zárlati intézkedéssel még nem érintett települések esetében a leveles hajtások eltávolítása, a tőke kivágása előtt. A fertőzési gyanú bejelentését követően az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv helyszíni szemle során jelöli meg a tünetes szőlő növényeket és határozatban rendeli el azok kivágását, illetve közli a további zárlati előírásokat.

A 2025. év előtt fertőzött körzetbe sorolt településeken az előző évek során elrendelt zárlati intézkedésnek megfelelően a tüneteket mutató, a további fertőzés forrását és a betegség fennmaradását biztosító tőkéket gyökerestől ki kell kivágni és megsemmisíteni.

A körülhatárolt területről hatósági engedély nélkül szőlő növényt, szőlő szaporító- és ültetési anyagot, egyéb gazdanövényt: erdei iszalagot (*Clematis vitalba*) kivinni, illetve a károsító terjedését elősegítő terméket, anyagot, eszközt a területre bevinni tilos!

A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca rovar szőlővesszőkre esetlegesen lerakott tojásainak elpusztítása érdekében a tél végi metszéssel eltávolított vesszőket égetéssel kell megsemmisíteni, valamint tavasszal a rügyfakadás

közeli időszakban olajos (paraffin- vagy vazelinolaj) készítményekkel kell gyéríteni a vesszőkön áttelelő tojások számát.

Fontos! Az eredményes védekezés feltétele, hogy minden szőlőtermelő védekezzen a védekezési felhívás figyelembevételével, és ne veszélyeztessen sem a saját, sem a szomszédos termelők növényvédelmi, növény-egészségügyi biztonságát a védekezés elmulasztásával.

Zárlati intézkedéssel érintett települések - fertőzött körzet:

Alsónemesapáti, Alsórajk, Bak, Babosdöbréte, Baktüttös, Balatongyörök, Barlahida, Becsehely, Belezna, Bocfölde, Bocska, Boncodfölde, Böde, Börzönce, Bucsuszentlászló, Bucsuta, Csapi, Csatár, Csertomaj, Csertalajos, Csonkahegyhát, Csörnyeföld, Dióskál, Dobri, Egervár, Eszteregnye, Felsőrajk, Fityeháza, Fűzvölgy, Galambok, Garabonc, Gellénháza, Gelse, Gelsesziget, Gosztola, Gősfő, Gutorfölde, Hahót, Hernyék, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Iklódbördőce, Iborfia, Kacorlak, Kávás, Kehidakustány, Keménfa, Kerkaszentkirály, Kerkateskánd, Kilimán, Kiscsehi, Kiskutas, Kispáli, Kistrécs, Kistolmács, Kerecsény, Lakhegy, Lendvadedes, Lenti, Letenye, Lickóvadás, Lovászi, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Milejszeg, Molnári, Murakeresztúr, Murarátka, Nagybakónak, Nagykanizsa, Nagykapornak, Nagylengyel, Nagypáli, Nagyrécs, Nemeshegy, Nemesszentandrás, Nova, Ormándlak, Orosztony, Padár, Pacsa, Pálfi, Pálfi, Petőhegy, Petrikeresztúr, Petrivente, Pölöske, Pölöskefő, Pötréte, Pusztaderics, Pusztamagyaród, Pusztaszentlászló, Rédec, Rigyác, Salomvár, Sárhida, Sármed, Söjtör, Szentgyörgyvár, Szentkozmadombja, Szentlászló, Szentpéterfő, Szécsisziget, Teskánd, Tófej, Tormafő, Tornyszentmiklós, Tótszentmárton, Újudvar, Vasboldogasszony, Vállus, Várköly, Vindornafok, Vonyarcvashegy, Zajk, Zalaboldogfa, Zalaegerszeg, Zalaigrice, Zalaháshágy, Zalaistván, Zalalövő, Zalakaros, Zalakoppány, Zalamerenye, Zalaszentbalázs, Zalaszentgyörgy, Zalaszentjakab, Zalaszentlászló, Zalaszentmihály, Zalatárnok, Zalaudvarnok, Zebecke,

A 2025. évi fertőzések alapján fertőzött körzetbe sorolt települések: Kemendollár, Nagyrada, Páka, Tekenye, Túrje, Zalacsé, Zalasabar, Zalaszentgrót, Vöckönd

Zárlati intézkedéssel érintett települések – védő (puffer) zóna:

Alibánfa, Almásháza, Alsópáhok, Bagod, Batyk, Becsvölgye, Bezeréd, Bókaháza, Borsfa, Csőde, Csömödér, Dobronhegy, Dötk, Egeraracs, Esztergályhorváti, Felsőpáhok, Gétye, Gomboszeg, Gyenesdiás, Gyülevész, Gyűrűs, Hévíz, Hottó, Iborfia, Keszthely, Kisbucsa, Kisgyőr, Kissziget, Maróc, Miháld, Mihályfa, Mikekarácsonyfa, Misefa, Muraszemenye, Nagyutas, Nemesapáti, Nemesrádó, Nemessándorháza, Németfalu, Óhid, Oltár, Orbánosfa, Pakod, Pókaszeptek, Sand, Semjénháza, Sénye, Sormás, Surd, Szalapa, Szentmargitfalva, Szentpéterúr, Szepetnek, Szilvagy, Tilaj, Tilajhegy, Tótszerdahely, Valkonya, Vindornaszőlős, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalasárszeg, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc, Zalaszentmárton, Zalaújlak

Zalaegerszeg, 2025. szeptember 22.

Dr. Sifter Rózsa főispán nevében és megbízásából:

Szabó Béla
osztályvezető

